



沃巴盾
WOBADUN



富地清

联苯·噻虫胺

总有效成分含量：1%
有效成分及其含量：
联苯菊酯0.5% 噻虫胺0.5%
剂型：颗粒剂



低毒




农药登记证号:PD20230858
农药生产许可证号:农药生许(皖)0042
产品标准号:Q/HW 44-2023

净含量：20千克


杀虫剂

联苯·噻虫胺

总有效成分含量：1%
有效成分及其含量：
联苯菊酯0.5% 噻虫胺0.5%
剂型：颗粒剂



低毒



农药登记证号:PD20230858
农药生产许可证号:农药生许(皖)0042
产品标准号:Q/HW 44-2023

净含量：20千克

杀虫剂

产品性能:
本品是联苯菊酯和噻虫胺二元复配的杀虫剂。联苯菊酯属拟除虫菊酯类杀虫剂，具有触杀、胃毒作用。噻虫胺为新烟碱类杀虫剂，烟碱乙酰胆碱受体拮抗剂，可影响昆虫中枢神经系统的突触，具有触杀、胃毒和根部内吸活性。二者复配用于防治韭菜韭蛆。

使用范围和用法:

作物/场所	防治对象	用药量 (制剂量/亩)	施用方式
韭菜	韭蛆	3000-4000克/亩	撒施


使用技术要求:
1.本品应在韭菜韭蛆发生初期用药1次，均匀撒施，及时覆土。2.在大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。3.在韭菜上每季作物最多使用1次，安全间隔期14天。

注意事项:
1.本品对眼睛有刺激性，使用时应穿长衣长裤、靴子、戴帽子、护目镜、口罩、手套等防护用品；施药期间不可吃东西、饮水、吸烟等；施药后应及时洗手、洗脸等暴露部位皮肤并清洗施药时穿着的衣物。2.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处理，及时交回农药包装废弃物回收站。3.禁止在河塘等水体中清洗施药器具，施药后剩余药液不得随意倾倒；水产养殖区、河塘等水体附近禁用。4.施药地块及其周围植物开花期禁用，使用时应密切关注对附近蜂群的影响。5.本品不可与碱性物质混用，建议与其他作用机制不同的杀虫剂轮换使用，以延缓抗性产生。6.孕妇及哺乳期妇女禁止接触本品。


中毒急救措施:
1.用药时如果感觉不适，立即停止工作，采取急救，并携此标签送医就诊。2.皮肤接触：立即脱掉被污染的衣物，用肥皂和大量清水彻底清洗受污染的皮肤。必要时请医生诊治。3.眼睛滴药：用清水冲洗至少15分钟，再请医生诊治。4.发生吸入：立即将吸入者转移到空气新鲜处，如果停止呼吸，需进行人工呼吸。5.发生误服：用清水充分漱口后，立即携带农药标签送医院就诊。本品无特殊解毒药，对症治疗。大量吞服时可洗胃，不能催吐。

储存和运输方法:
1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处，不可倒置，远离火源、热源。2.置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方，并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋；装卸人员穿戴防护用品，要轻搬轻放，确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。


生产企业名称：安徽华微生物技术有限公司
地址：安徽省滁州市丰桥区经济开发区化工园内纬二路南侧
邮编：234000 电话：0557-4378999 传真：0557-4372066 植保投诉电话：13805207888
生产日期及批号：见喷码 质量保证期：2年
技术咨询热线：0371-63253008



杀虫剂




沃巴盾
WOBADUN




富地清

联苯·噻虫胺

总有效成分含量：1%
有效成分及其含量：
联苯菊酯0.5% 噻虫胺0.5%
剂型：颗粒剂



低毒



农药登记证号:PD20230858
农药生产许可证号:农药生许(皖)0042
产品标准号:Q/HW 44-2023

净含量：20千克

杀虫剂



沃巴盾
WOBADUN



富地清

联苯·噻虫胺

总有效成分含量：1%
有效成分及其含量：
联苯菊酯0.5% 噻虫胺0.5%
剂型：颗粒剂



低毒



农药登记证号:PD20230858
农药生产许可证号:农药生许(皖)0042
产品标准号:Q/HW 44-2023

净含量：20千克

杀虫剂

产品性能:
本品是联苯菊酯和噻虫胺二元复配的杀虫剂。联苯菊酯属拟除虫菊酯类杀虫剂，具有触杀、胃毒作用。噻虫胺为烟碱类杀虫剂，烟碱乙酰胆碱受体拮抗剂，可影响昆虫中枢神经系统的突触，具有触杀、胃毒和根部内吸活性。二者复配用于防治韭菜韭蛆。

使用范围和用法:

作物/场所	防治对象	用药量 (制剂量/亩)	施用方式
韭菜	韭蛆	3000-4000克/亩	撒施

使用技术要求:
1.本品应在韭菜韭蛆发生初期用药1次，均匀撒施，及时覆土。2.在大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。3.在韭菜上每季作物最多使用1次，安全间隔期14天。

注意事项:
1.本品对眼睛有刺激性，使用时应穿长衣长裤、靴子、戴帽子、护目镜、口罩、手套等防护用品；施药期间不可吃东西、饮水、吸烟等；施药后应及时洗手、洗脸等暴露部位皮肤并清洗施药时穿着的衣物。2.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处理，及时交回农药包装废弃物回收站。3.禁止在河塘等水体中清洗施药器具，施药后剩余药液不得随意倾倒；水产养殖区、河塘等水体附近禁用。4.施药地块及其周围植物开花期禁用，使用时应密切关注对附近蜂群的影响。5.本品不可与碱性物质混用，建议与其他作用机制不同的杀虫剂轮换使用，以延缓抗性产生。6.孕妇及哺乳期妇女禁止接触本品。

中毒急救措施:
1.用药时如果感觉不适，立即停止工作，采取急救，并携此标签送医就诊。2.皮肤接触：立即脱掉被污染的衣物，用肥皂和大量清水彻底清洗受污染的皮肤。必要时请医生诊治。3.眼睛滴药：用清水冲洗至少15分钟，再请医生诊治。4.发生吸入：立即将吸入者转移到空气新鲜处，如果停止呼吸，需进行人工呼吸。5.发生误服：用清水充分漱口后，立即携带农药标签送医院就诊。本品无特殊解毒药，对症治疗。大量吞服时可洗胃，不能催吐。

储存和运输方法:
1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处，不可倒置，远离火源、热源。2.置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方，并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋；装卸人员穿戴防护用品，要轻搬轻放，确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。

生产企业名称：安徽华微生物技术有限公司
地址：安徽省滁州市丰桥区经济开发区化工园内纬二路南侧
邮编：234000 电话：0557-4378999 传真：0557-4372066 植保投诉电话：13805207888
生产日期及批号：见喷码 质量保证期：2年
技术咨询热线：0371-63253008



杀虫剂