

专业技术配方 防治水稻立枯青枯

土壤内吸杀菌剂

☑甲霜灵和噁霉灵的复配制剂

☑主要防治土传病害

☑配合调酸剂使用，效果更佳

☑保护根系，防病菌



新包装
仙葩在瓶盖

- KEKUXING -
- Agrochemical Series -



水稻出现倒伏 可能是有病害了哦

立枯、青枯病会使水稻枯萎，甚至整株死亡



- KEKUXING -
- Agrochemical Series -

吸收渗透 主要防治土传病害

克枯星45%甲霜·噁霉灵具有渗透功能
可被植物吸收并传导到根部周围
从而避免植物根部受病原菌侵害
能有效防治水稻苗期立枯病、青枯病



- KEKUXING -
- Agrochemical Series -

克枯星45%甲霜·噁霉灵 实物粉剂

实拍图，只为更直观的向大众展示克枯星45%甲霜·噁霉灵药剂的实际面貌。因为是闪光灯下拍摄，药剂颜色和自然光下显现的肯定会有色差哦，望知晓。



- KEKUXING -
- Agrochemical Series -


克枯星45%甲霜·噁霉灵 适用于以下病害

烂茎烂根倒伏推荐提前预防，避免造成伤株减产



合理用药植物更健康

REASONABLE AGRICULTURAL MAKES PLANTS HEALTHIER



品 牌：克枯星

产品名称：

甲霜·噁霉灵

产品规格：50克

药剂毒性：低毒

保 质 期：2年

⚠ 注意事项

- 1、本品不能与碱性农药等混合使用。
- 2、建议与其他作用不同的杀菌剂轮换使用，以延缓产生抗药性。
- 3、使用本品应采取相应的安全防护措施，穿防护服，戴防护手套、口罩等，避免皮肤接触及口鼻吸入。
- 4、施药期间不可吸烟或饮食，施药后及时洗手、脸及其他裸露皮肤。
- 5、孕妇及哺乳期妇女禁止接触本品。

- KEKUXING -
- Agrochemical Series -

农药登记证号：PD20090193
登记证持有人：黑龙江绿丰源生物科技有限公司
农药名称：甲霜·噁霉灵
剂型：可湿性粉剂
毒性及其标识：☞

总有效成分含量：45%
有效成分及其含量：
噁霉灵27.5% 甲霜灵17.5%
使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
水稻	苗期立枯病	2.2-3.3克/平方米加水1千克稀释	苗床喷雾
水稻	青枯病	2.2-3.3克/平方米加水1千克稀释	苗床喷雾

使用技术要求：
1.可以床土消毒。2.可以在秧苗一叶一心期后进行苗床喷雾。3.本品每季作物顶多使用1次。

产品性能：
本品具有渗透功能，可以被植物吸收并传导到根部周围，避免植物根部受病原菌侵害，能够有效防治水稻苗期立枯、青枯病。

注意事项：
1.本品不能与碱性农药等混合使用。2.防治水稻苗期立枯、青枯病时应与调酸剂配合使用，效果更佳。3.远离水产养殖区施药，禁止在河塘等水域清洗施药器具。4.施药时应穿戴防护服、手套、口罩等，施药期间不可吸烟或饮食，施药后及时洗手脸及其他裸露皮肤。5.建议与其他作用不同的杀菌剂轮换使用。6.使用后的包装物应妥善处理，不能随意丢弃，也不可作他用。7.孕妇及哺乳期妇女禁止接触本品。

中毒急救措施：
1.如药液溅到皮肤上或眼睛内，应立即用大量清水冲洗，必要时及时就医。2.如不慎误服，立即携本标签将病人送医院救治。在病人神志清醒情况下给予活性炭催吐。3.尚无特效解毒剂，只能对症治疗。

储存和运输方法：
1.应存放在阴凉、干燥、通风处，远离热源或火源。2.置于儿童触及不到的地方，并加锁保存。不得与食品、饮料、粮食、饲料和种子等同贮同运。3.运输时应避免雨淋和挤压。

质量保质期：2年

备注：
核准日期：2009-01-08
重新核准日期：2020-10-21