

专业技术配方 防治甘蓝蜗牛

甘蓝蜗牛专杀剂

☑具胃毒作用，对蜗牛有引诱性

☑杀软体动物剂


☑蜗牛吸收后麻痹死亡 / 接触后分泌大量粘液脱水而亡



- RUILONGMIDA -
- Agrochemical Series -

预防甘蓝被蜗牛祸害

在春秋季节蜗牛频繁活动时，撒施四聚乙醛



- RUILONGMIDA -
- Agrochemical Series -

具有胃毒 对蜗牛有引诱作用

四聚乙醛为一种选择性强的杀软体动物剂，药剂被蜗牛取食或接触后，破坏蜗牛的消化系统，使蜗牛体内的乙酰胆碱酯酶大量释放，破坏蜗牛体内特殊粘液的正常分泌，造成蜗牛体迅速脱水，神经麻痹，中毒而死亡

- RUILONGMIDA -
- Agrochemical Series -

瑞隆密达10%四聚乙醛 实物颗粒

实拍图，只为更直观的向大众展示瑞隆密达10%四聚乙醛药剂的实际面貌。因为是闪光灯下拍摄，药剂颜色和在自然光下显现的肯定会有色差哦，望知晓。



- RUILONGMIDA -
- Agrochemical Series -

瑞隆密达10%四聚乙醛 适用于甘蓝已有蜗牛


蜗牛会破坏植物叶片，传播病害，如枯萎病等



- RUILONGMIDA -
- Agrochemical Series -

合理用药植物更健康

REASONABLE AGRICULTURAL MAKES PLANTS HEALTHIER



品 牌：瑞隆密达
产品名称：四聚乙醛
产品规格：150克
药剂毒性：**微毒**
施用方式：撒施
保 质 期：2年

⚠ 注意事项

- 1、本品不能与碱性物质混用；在甘蓝上安全间隔期为7天，每季顶多使用次数为2次。
- 2、如遇低温（15℃以下）或高温（35℃以上）因蜗牛活动力弱，影响防治果。
- 3、使用本品应穿戴防护服、戴手套及口罩，避免吸入药剂细颗粒粉尘。
- 4、施药时不得吸烟、饮水或进食，工作完毕用肥皂水洗手和身体裸露部位。
- 5、避免孕妇和哺乳期妇女接触本产品。

- RUILONGMIDA -
- Agrochemical Series -

农药登记证号：PD20173303

登记证持有人：瑞隆农化技术（宿州）有限公司

农药名称：四聚乙醛

剂型：颗粒剂

毒性及其标识：**微毒**

有效成分及其含量：

四聚乙醛10%

使用范围和使用方法：

作物/场所 防治对象 用药量（制剂量/亩） 施用方式

甘蓝 蜗牛 290-330克/亩 撒施

使用技术要求：

1.于甘蓝蜗牛发生期施药。2.施药后如遇大雨，药剂被冲散至土壤中，会降低药效，可补充施药。小雨对药效影响不大。3.本品在甘蓝上的安全间隔期7天，每季作物生长季节内施药次数不要超过2次，施药间隔期7-10天并应与其它作用机制的农药轮换使用。

产品性能：

四聚乙醛为一种选择性强的杀软体动物剂，具有胃毒作用，对蜗牛有一定的引诱作用。药剂被蜗牛取食或接触后，破坏蜗牛的消化系统，使蜗牛体内的乙酰胆碱酯酶大量释放；破坏蜗牛体内特殊粘液的正常分泌，造成蜗牛体迅速脱水，神经麻痹，中毒而死亡。主要用于防治甘蓝蜗牛。

注意事项：

1.严格按照农药规程施药，施药时应穿防护服、戴手套及口罩。施药时不得吸烟、饮水或进食，工作完毕用肥皂水洗手和身体裸露部位。2.适宜施药温度为15℃-35℃，因为低温(15℃以下)或高温(35℃以上)蜗牛活动力弱，影响防治效果。施药后不要在田间践踏。3.本品对鸟及水生生物有毒，施药后的水不得直接排入水源，远离水产养殖区、鱼塘等水体施药，禁止在池塘等水体清洗施药器具。鸟类保护区附近禁用，施药后立即覆土。4.避免孕妇和哺乳期妇女接触本产品。5.本品不能与碱性物质混用；6.用过的容器应妥善处理，不可作他用，也不可随意丢弃。

中毒急救措施：

急救措施：不慎吸入，应将病人移至空气流通处。不慎接触皮肤或溅入眼睛，应用大量清水冲洗至少15分钟。经口误服：立即停止服用，用清水充分漱口后，立即携带农药标签送医院就诊。

储存和运输方法：

本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源或热源。置于儿童触及不到之处，并加锁。勿与食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。

质量保证期：2年

备注：

核准日期：2017-12-20

重新核准日期：/