规格:5克*800袋、100克*100袋

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
室内	蚂蚁	/	投放

使用技术要求:

将药剂投放于蚂蚁经常活动场所,根据蚁密度适当增加或减少用药量(如在潮湿的地方,用防潮物品垫上或放在浅口器皿里)。

产品性能:

本品含引诱剂,施药后工蚁会将药剂带回蚁巢,供巢内蚂蚁取食并饲喂给蚁后,通过胃毒和触杀的方式致蚂蚁死亡,达到蚁巢种群得到控制目的。适用于家庭、酒店、宾馆、写字间等蚂蚁出没场所。

注意事项:

1.本品请勿让儿童玩耍,避免误食。使用本品时要戴口罩和手套,用后请及时洗手。2.本品仅限于室内使用,施药时请勿污染食物和饮用水。3.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处理,及时交回农药经营者或农药包装废弃物回收站。4.孕妇、哺乳期妇女及有过敏性体质者禁止接触本品。

中毒急救措施:

1.皮肤接触:立即用肥皂和大量清水冲洗。2.眼睛溅入:用大量清水冲洗并及时就医。3.发生吸入:将吸入者转移到空气清新处,立即请医生诊治。4.误食:请勿引吐,用清水充分漱口并携带本品立即就医。

储存和运输方法:

1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处,不可倒置。远离火源、热源。2.置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方,并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋;装卸人员穿戴防护用具,要轻搬轻放,确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。