



使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
番茄	灰霉病	150—200毫升/亩	喷雾

使用技术要求:

1. 于番茄灰霉病发病前或发病初期喷雾施药, 可喷药2次, 间隔7天左右。兑水量45—60公斤/亩, 喷雾应均匀周到。2. 使用前请摇匀。遇大风或预计1小时之内下雨, 请勿施药。3. 在番茄上使用的安全间隔期为7天, 每季最多使用2次。4. 农药施用人员需严格按照施药量、施药方法等进行施药, 并在专业植保人员的指导下施药, 不得随意增加施药量和施药次数。


产品性能:

氟吡菌酰胺通过破坏呼吸电子传递链中的复合物II(琥珀酸脱氢酶)来抑制线粒体功能, 影响病菌的呼吸作用, 导致病菌不能提供病菌的能量需求, 进而杀死病菌或抑制其生长发育。本品用于防治番茄灰霉病。

储存和运输方法:

1. 本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处, 不可倒置, 远离火源、热源。2. 本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方, 并加锁保存。3. 勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等混储同运。4. 运输过程中要防晒、防雨淋; 装卸人员穿戴防护用品, 要轻搬轻放, 确保容器不破损、不倒塌、不坠落、不损坏。5. 本品与中等氧化剂化学不相容, 应避免与氧化剂接触。

备注: 质量浓度105克/升。



杀菌剂

氟吡菌酰胺
有效成分及其含量

氟吡菌酰胺

有效成分及其含量:

氟吡菌酰胺10%

剂型: 悬浮剂

微毒

净含量: 500克

杀菌剂

注意事项:

1. 使用前仔细阅读此标签, 并严格按照标签使用。
2. 本品应避免与氧化剂接触。
3. 应与不同作用机理的杀菌剂轮换使用, 以延缓抗性产生。
4. 配药和施药时应穿长衣长裤防护服、鞋子, 戴帽子、口罩、护目镜和防护手套等防护用品, 避免眼睛或皮肤接触及口鼻吸入; 工作期间不可吸烟、饮水和进食; 工作后及时清洗手、脸等暴露部位皮肤, 更换并清洗防护衣物和用具。
5. 农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处理, 应及时交回农药经营者或农药包装废弃物回收站; 禁止在河道等水体中清洗施药器具。施药后剩余药液不得随意倾倒; 鸟类保护区及附近禁用; 桑园和蚕室附近禁用。
6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女及过敏者避免接触本品。

中毒急救措施:

使用中或使用后如出现不适, 应立即停止接触, 采取急救措施, 并携带标签送医院就诊。溅入眼睛, 用大量清水冲洗至少15分钟。皮肤接触, 脱去被污染的衣物后立即用清水冲洗至少15分钟。误服, 立即离开施药现场并转移至空气流通处。误服, 用清水充分漱口后, 立即携带标签送医院就诊。本品无特殊解毒剂, 对症治疗。

农药登记证号:

PD20262279

农药生产许可证号:

农药生许(鲁)0143

产品质量标准号:

Q/571521SHB 018-2025

登记持有人:

山东海博生物科技有限公司

地址:

山东省烟台莱州经济开发区南环路西首

邮编:

252300

电话:

0635-6581268

质量保证期:

2年

生产日期及批号:

见瓶身或合格证

注意事项:

1. 使用前仔细阅读此标签, 并严格按照标签使用。
2. 本品应避免与氧化剂接触。
3. 应与不同作用机理的杀菌剂轮换使用, 以延缓抗性产生。
4. 配药和施药时应穿长衣长裤防护服、鞋子, 戴帽子、口罩、护目镜和防护手套等防护用品, 避免眼睛或皮肤接触及口鼻吸入; 工作期间不可吸烟、饮水和进食; 工作后及时清洗手、脸等暴露部位皮肤, 更换并清洗防护衣物和用具。
5. 农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处理, 应及时交回农药经营者或农药包装废弃物回收站; 禁止在河道等水体中清洗施药器具。施药后剩余药液不得随意倾倒; 鸟类保护区及附近禁用; 桑园和蚕室附近禁用。
6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女及过敏者避免接触本品。

中毒急救措施:

使用中或使用后如出现不适, 应立即停止接触, 采取急救措施, 并携带标签送医院就诊。溅入眼睛, 用大量清水冲洗至少15分钟。皮肤接触, 脱去被污染的衣物后立即用清水冲洗至少15分钟。误服, 立即离开施药现场并转移至空气流通处。误服, 用清水充分漱口后, 立即携带标签送医院就诊。本品无特殊解毒剂, 对症治疗。

农药登记证号: PD20262279

农药生产许可证号: 农药生许(鲁)0143

产品质量标准号: Q/571521SHB 018-2025

登记持有人: 山东海博生物科技有限公司

地址: 山东省烟台莱州经济开发区南环路西首

邮编: 252300

电话: 0635-6581268

质量保证期: 2年

生产日期及批号:

见瓶身或合格证



杀菌剂

