中农立华®

吡虫啉

有效成分及其含量：
吡虫啉70%
剂型：水分散粒剂

低毒

净含量：5g

杀虫剂

产品性能：

吡虫啉属于硝基亚甲基类杀虫剂，具有触杀和胃毒作用。它通过选择性抑制昆虫神经系统中烟酸乙酰胆碱酶受体，破坏昆虫中枢神经的正常传导，使害虫神经麻痹后死亡。对甘蓝蚜虫防治效果较好。

使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	制剂用药量		使用方法
甘蓝	蚜虫	22.5-30克/公顷	1.5-2克/亩	喷雾

(注(1)公顷用制剂量=亩用制剂量x15
(2)总有效成分量浓度值(毫克/千克)=制剂含量x1000000)÷制剂稀释倍数)

防治技术说明：

1.为得到最好的防效，可在甘蓝蚜虫发生始盛期施药。喷雾时用水量一定要充足，使作物叶片正反面药液充分覆盖。2.避免在强阳光下使用，大风天或预计1小时内有雨，请勿施药。

注意事项：

1.本品在甘蓝上的安全间隔期为7天，每季作物使用次数为2次。2.建议与其他作用机制不同的杀虫剂轮换使用。3.使用本品时应穿戴适当的防护服和用具(如胶皮手套、口罩等)，施药时避免药液接触皮肤、眼睛和衣服、避免吸入药液；施药期间不可吃东西和饮水；施药后及时洗手洗脸。4.本品对蚕蚕和赤眼蜂有毒，桑园附近和赤眼蜂等天敌放飞区禁止使用。5.本品对蜜蜂有毒，开花植物花期及蜂房附近禁止使用。6.要远离水产养殖区用药，禁止在河塘等水体中清洗施药器具，避免药液及其废液污染水源地。7.用过的容器应妥善处理，不可做它用，也不可随意丢弃。8.孕妇、哺乳期妇女及过敏者禁止接触。

中毒急救措施：

不慎接触到皮肤或溅入眼睛，用大量水清洗皮肤或眼睛15-20分钟；不慎吸入，应将病人移至空气流通处；误服后发生中毒现象时，立即饮1-2杯水催吐，并携标签就医，请医生对症治疗。本品无特效解毒药剂，可对症治疗。

贮存和运输方法：

1.本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源或热源。
2.置于儿童、无关人员触及不到的地方，并加锁保存。
3.勿与食品、饮料、粮食、饲料等其他商品同贮同运。

农药登记证号：PD20161451
农药生产许可证号：农药生许（津）0001
产品标准号：GB 28139-2011
生产企业名称：中农立华（天津）农用化学品有限公司
地址：天津市武清区农场南津蓟铁路东侧　邮编：301700
电话：022—58953555　　传真：022—29382943
生产日期及批号：见包装
分装日期及批号：见包装　　质量保证期：2年

2458412009276035

生产日期及批号：
物　流　码：2026071001

杀虫剂