


保定·雷吉·耀纵·佳电

农药登记证号: PD20180746
农药生产许可证号: 农药许(冀) 0011
产品质量标准号: Q/HNH50-2021

净含量: 1千克

杀虫剂



联苯·噻虫胺
总有效成分含量: 20%
有效成分及其含量:
联苯菊酯10% 噻虫胺10%
剂型: 悬浮剂

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量 (制剂量/亩)	施药方式
小麦	蚜虫	8-12毫升/亩	喷雾
甜菜	黄条跳甲	45-65毫升/亩	喷雾

使用技术要点:
1.本品在甘蔗黄条跳甲发生盛期用药, 根据虫情轻重, 可每隔2次, 每次施药间隔7-10天, 每亩每次30-40毫升, 在甘蔗上安全间隔期10天, 每季最多使用2次, 2.本品对小麦蚜虫触杀和胃毒作用, 每季使用40-60毫升/亩, 在小麦上安全间隔期14天, 每季最多使用1次, 3.本品在田间使用, 4.大风天或预计1小时内降雨, 请勿用药。

产品性能:
联苯菊酯是拟除虫菊酯类杀虫剂, 噻虫胺是新型烟酰胺类杀虫剂, 二者复配具有内吸、触杀和胃毒作用, 可用于防治甘蔗黄条跳甲、小麦蚜虫。
贮存和运输方法:
1.本品应贮存在阴凉、干燥、通风、防潮处, 不可暴晒, 远离火源、热源, 2.本品应贮置于儿童、无关人员及动物不能到达的地方, 并加贴保存, 3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等混装混运, 4.运输过程中要轻拿轻放, 避免与人员直接接触, 5.要轻倒轻放, 确保容器不漏, 不破裂, 不泄漏, 不挥发。

杀虫剂



噻虫胺
总有效成分含量: 20%
有效成分及其含量:
噻虫胺10%
剂型: 悬浮剂

注意事项:

1.使用前仔细阅读此标签, 并严格按照标签说明使用。本品可与碱性、碱性农药混用, 但其中某些成分可能与碱性农药发生反应, 导致药效降低。2.本品与其他作用机制不同的杀虫剂混用, 可增强药效。3.本品对鱼类、鸟类、蜜蜂、蚕、水生生物等有毒, 使用时应避免污染水源、鱼塘、蜂箱等。4.本品对皮肤、黏膜有刺激性, 使用时应避免接触皮肤、黏膜。5.本品对水生生物有毒, 使用时应避免污染水源、鱼塘等。6.本品对鱼类、鸟类、蜜蜂、蚕、水生生物等有毒, 使用时应避免污染水源、鱼塘、蜂箱等。7.本品对皮肤、黏膜有刺激性, 使用时应避免接触皮肤、黏膜。8.本品对水生生物有毒, 使用时应避免污染水源、鱼塘等。9.本品对鱼类、鸟类、蜜蜂、蚕、水生生物等有毒, 使用时应避免污染水源、鱼塘、蜂箱等。10.本品对皮肤、黏膜有刺激性, 使用时应避免接触皮肤、黏膜。

中毒急救措施:

1.使用本品时, 应穿戴防护服、手套、口罩等, 避免直接接触。2.使用本品时, 应避免吸入粉尘、烟雾等。3.使用本品时, 应避免接触皮肤、黏膜。4.使用本品时, 应避免污染水源、鱼塘等。5.使用本品时, 应避免污染农田、果园等。6.使用本品时, 应避免污染蜂箱等。7.使用本品时, 应避免污染水源、鱼塘等。8.使用本品时, 应避免污染农田、果园等。9.使用本品时, 应避免污染蜂箱等。10.使用本品时, 应避免污染水源、鱼塘等。

质量保证:

质量保证期: 2年
生产日期及批号: 见瓶塞

杀虫剂

