

巴润克®

总有效成分含量:36%
有效成分及其含量:
戊唑醇24% 肟菌酯12%
剂型:悬浮剂
微毒

净含量:10克

杀菌剂


农药登记证号:PD20230437 农药生产许可证号:农药生许(鲁)0131 产品质量标准证号:Q/370921SDY 045-2021

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量(克/亩)	使用方式
小麦	赤霉病	20-30毫升/亩	喷雾
水稻	稻曲病	21-31毫升/亩	喷雾
玉米	大斑病	25-30毫升/亩	喷雾

使用技术要求:
1.防治水稻和曲霉,首次施药适宜在水稻破口前7天左右,水稻和曲霉发病前或发病初期,可再次施药,用水量40-60公斤/亩。2.防治小麦赤霉病时,在小麦扬花后不能使用,仅允许在扬花前或扬花初期使用,避免扬花后使用本品增加毒素污染的风险。每亩兑水量35-45公斤。3.防治玉米大斑病时,于发病初期施药,间隔7-10天,再施药一次,用水量40-50升/亩。4.大风天或预计1小时内降雨,请勿施药。施药时配好的药液要立即使用。5.在水稻和小麦上的安全间隔期为28天,每季作物最多使用2次;在玉米上的安全间隔期为21天,每季作物最多使用2次。
产品性能:
本品由甲氧基苯基吡唑酮类杀菌剂肟菌酯和三唑类杀菌剂戊唑醇复配而成,具有保护和治疗作用,用于防治水稻和曲霉、小麦赤霉病和玉米大斑病。
注意事项:
1.使用前仔细阅读此标签,并严格按照标签使用。2.本品避免与氧化剂接触。3.配药和施药时应穿长衣长裤,戴防护帽、鞋子、戴袖套、口罩、护目镜和防护手套等防护用品,避免眼睛或皮肤接触及口鼻吸入;施药期间不可吸烟、饮水和进食;施药后及时清洗手、脸等暴露部位皮肤,更换并清洗防护衣物和用具。4.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处理,应及时交回农药经营者或农药包装废弃物回收站;禁止在河塘等水体中清洗施药器具,施药后剩余药液不得随意倾倒;水产养殖区、河塘等水体及附近禁用;鱼或虾蟹等水产养殖禁用;施药后的田水不得直接排入水体;蚕室和桑园附近禁用。5.儿童、孕妇、哺乳期妇女及过敏者避免接触本品。
中毒急救措施:
使用中或使用后如出现不适,应立即停止接触,采取急救措施,并携带标签送医院就诊。误入眼睛,用大量清水冲洗至少15分钟;皮肤接触,脱去被污染的衣物后立即用清水冲洗至少15分钟;误吸,立即离开施药现场并转移至空气新鲜处;误服,用清水充分漱口后,立即携带标签送医院就诊。本品无特殊解毒剂,对症治疗。
储存和运输方法:
1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处,不可倒置,远离火源、热源。2.本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方,并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等混放。4.运输过程中要防晒、防雨淋;装卸人员穿戴防护用品,要轻搬轻放,确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。5.本品与中等氧化剂化学不相容,应避免与氧化剂接触。
备注:质量浓度396克/升(戊唑醇132克/升,肟菌酯264克/升)。
质量保证期:2年 生产日期及批号:见喷码
登记证持有人:山东东远生物科技有限公司
地址:泰安市宁阳县经济技术开发区生物化工基地国家庄东888米
电话:0538-5483666
传真:0538-5483999
邮编:271400
植保服务热线:400-0661-768

杀菌剂



巴润克®

总有效成分含量:36%
有效成分及其含量:
戊唑醇24% 肟菌酯12%
剂型:悬浮剂
微毒

净含量:100克

杀菌剂

巴润克®

总有效成分含量:36%
有效成分及其含量:
戊唑醇24% 肟菌酯12%
剂型:悬浮剂
微毒

净含量:100克

杀菌剂

巴润克®

总有效成分含量:36%
有效成分及其含量:
戊唑醇24% 肟菌酯12%
剂型:悬浮剂
微毒

净含量:100克

杀菌剂



巴润克®

总有效成分含量:36%
有效成分及其含量:
戊唑醇24% 肟菌酯12%
剂型:悬浮剂
微毒

净含量:500克

杀菌剂

巴润克®

总有效成分含量:36%
有效成分及其含量:
戊唑醇24% 肟菌酯12%
剂型:悬浮剂
微毒

净含量:500克

杀菌剂

巴润克®

总有效成分含量:36%
有效成分及其含量:
戊唑醇24% 肟菌酯12%
剂型:悬浮剂
微毒

净含量:500克

杀菌剂

