




无炭绿®

农药登记证号: PD20210295
农药生产许可证号: 农药生许(鲁) 0325
产品标准号: Q/371724STF 027—2022
净含量: 500克

杀菌剂



戊唑·咪鲜胺

总有效成分含量: 40%

有效成分及其含量:

戊唑醇13.3% 咪鲜胺26.7%

剂型: 水乳剂

低毒

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
小麦	赤霉病	20—25毫升/亩	喷雾
水稻	稻瘟病	25—35克/亩	喷雾
香蕉	黑星病	1000—1500倍	喷雾

使用技术要求:

1.本品于香蕉黑星病发病前或发病初期开始施药,间隔7天。2.小麦赤霉病发生初期均匀喷雾施药,每亩用水量40—50公斤,在小麦扬花初期施药1次,盛花期再施药1次,连续施药两次。每次间隔7—10天。3.本品于水稻稻瘟病发病前或发病初期进行常规喷雾施药,可用药2次,间隔7—10天,兑水30—50公斤/亩。4.本品在香蕉上每季作物最多使用3次,安全间隔期42天。在小麦上每季最多使用2次,安全间隔期28天;在水稻上每季最多使用2次,安全间隔期30天。5.大风或预计1小时内降雨,请勿施药。

产品性能:

本品为三唑类戊唑醇与咪唑类咪鲜胺复配而成的杀菌剂。戊唑醇具有内吸治疗作用,咪鲜胺具有一定的传导性能,对子囊菌及半知菌引起的病害有效,通过抑制甾醇的生物合成而起作用。因此二者复配对小麦赤霉病、香蕉黑星病和水稻稻瘟病有效。

杀菌剂



注意事项:

1.本品不可与呈碱性的农药等物质混合使用。2.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处置,及时交回农药包装废弃物回收站;禁止在池塘等水体中清洗施药器具,施药后剩余药液不得随意倾倒;水产养殖区、鱼塘等水体及附近禁用;鱼或虾蟹套养稻田禁用;施药后的田水不得直接排入水体;蚕室和桑园附近禁用。3.使用本品时应穿戴长衣、长裤、帽子、口罩、手套等防护措施,避免接触药液。施药期间不可吃东西和饮水。施药后及时洗手和洗脸。4.为延缓抗性产生,建议与其他作用机制不同的杀菌剂轮换使用。5.孕妇及哺乳期妇女避免接触本品。

中毒急救措施:

该产品对眼睛有刺激性,使用时避免药液接触眼睛。使用中或使用后如果感觉不适,应立即停止工作,采取急救措施,并携带标签送医就诊。急救措施:使用中或使用后如果感觉不适,应立即停止工作,采取急救措施,并携带标签送医院就诊。如接触皮肤,脱去污染的衣物,立即用软布去除沾染的农药,用肥皂和清水彻底清洗受污的皮肤,如溅及眼睛,应立即用大量清水冲洗眼睛15分钟;如不慎吸入,立即离开施药现场,转移到空气清新处;如误服,不要引吐,用清水充分漱口后立即送医院救治。

储存和运输方法:

1.储存于阴凉、通风、干燥、防雨处,远离火源或热源。置于儿童接触不到的地方并加锁。2.储运时严防潮湿和日晒,不得与食品、粮食、饲料等混储同运。

生产日期及批号: 见喷码

质量保证期: 2年

农药登记证持有人:

山东统防生物科技有限公司

地址: 山东省菏泽市巨野县董

官屯化工园区纬七路西段路北

邮编: 274900

电话: 0530—2023339

20250807-2/41107
050-01-2/606023

杀菌剂