
OCSEN | 奥胜®
质恒®
农药登记证号:
PD20181195
农药生产许可证号:
农药生许(鲁)0078
产品标准号:
Q/371721SAS029-2018
净含量:1000克
山东奥胜生物科技有限公司
丙溴磷
有效成分及其含量:
丙溴磷50%
剂型:乳油
低毒
产品性能:
本品属有机磷杀虫剂，具有速效性。在植物叶片上有较好的渗透性。其作用机制是抑制昆虫体内胆碱酯酶。
使用范围和使用方法:
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方式
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 80-120毫升/亩 | 喷雾
使用技术要求:
1.本品用于防治稻纵卷叶螟，卵孵盛期到低龄幼虫期使用，如在间隔7-10天后进行第二次施药，防效更佳。2.该药对茴蓿和高粱有药害。3.大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。
安全间隔期:28天，每季作物最多使用2次。
杀虫剂
注意事项:
1.不可与碱性农药混用；2.对蜜蜂、鱼虾、家禽等毒性高，使用时应注意不要污染河流、池塘、桑园、养蜂场，禁止在河塘等水体中清洗施药器具；蜜源作物花期禁用；3.使用本品时应穿戴防护服、胶靴，戴好口罩和手套，避免吸入药液；施药期间不可吃东西和饮水，施药后应及时洗手和洗脸；4.孕妇及哺乳期妇女避免接触；5.建议与其他作用机制不同的杀虫剂轮换使用。6.蚕室及桑园附近禁用；赤眼蜂等天敌放飞区禁用；鱼或虾蟹套养稻田禁用施药后用水不得直接排入水体。7.废弃物应妥善处理，不能乱丢乱放，也不能做他用。
中毒急救措施:
中毒：急性中毒多在12小时内发病，口服立即发病。轻度：头痛、头昏、恶心、呕吐、多汗、无力、胸闷、视力模糊、胃口不佳等，全血胆碱酯酶活力一般降至正常值的70-50%；中度：除上述症状外还出现轻度呼吸困难、还出现轻度呼吸困难、肌肉震颤、瞳孔缩小、精神恍惚、行走不稳、大汗、流涎、腹疼、腹泻。重者还会出现昏迷、抽搐、呼吸困难、口吐白沫、大小便失禁、惊厥、呼吸麻痹。急救措施:[1]用阿托品1-5mg皮下或静脉注射(按中毒轻重而定)；[2]用解磷定0.4-1.2g静脉注射(按中毒轻重而定)；[3]禁用玛仙、茶碱、吩噻嗪、利血平。[4]误服立即引吐、洗胃、导泄(清醒时才能引吐)。
储存和运输方法:
本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源或热源。置于儿童、无关人员触及不到之处，并加锁。勿与粮食、食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。
登记证持有人:山东奥胜生物科技有限公司
地址:山东省曹县青岩集乡江楼行政村(新型材料工业园)
电话:0530-2065111 传真:0530-2065118
邮编:274000
质量保证期:2年 生产日期及批号:见喷码
2026020703
1-0037-07