赛汐®



农药登记证号：
PD20190124
农药生产许可证号：
农药生许（津）0003
产品标准号：
Q/12 TJHB 009—2022

净含量:500毫升

天津市汉邦植物保护剂有限责任公司

杀虫剂

氟啶·啶虫脒

总有效成分含量：18%

有效成分及其含量：

啶虫脒8%　氟啶虫酰胺10%

剂型：可分散油悬浮剂

低毒

使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
黄瓜	蚜虫	9-13毫升/亩	喷雾

使用技术要求：1.应于黄瓜蚜虫发生始盛期喷雾施药，注意喷雾均匀周到。2.大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。**3.本品在黄瓜上使用的安全间隔期为3天，每季使用1次。**

天津市汉邦植物保护剂有限责任公司

地址:天津市静海区静海镇高家楼东104国道旁

电话:022-23950219　400 0336 966

传真:022-27968660　邮编:301600



杀虫剂

产品性能：

本品为两种不同作用机理的有效成分氟啶虫酰胺和啶虫脒的混配而成。氟啶虫酰胺是吡啶酰胺类杀虫剂，啶虫脒是氯化烟碱吡啶类杀虫剂，二者混配具有内吸、触杀和胃毒作用，速效性好、持效期长，对黄瓜蚜虫具有较好的防效。

注意事项：

1.在配制和使用本品时，应穿防护服，戴手套、口罩，避免皮肤接触及口鼻吸入，严禁吸烟和饮食。2.水产养殖区、河塘等水体附近禁用，禁止在河塘等水域清洗施药器具。3.（周围）开花植物花期禁用，施药期间应密切关注对附近蜂群的影响。4.蚕室和桑园附近禁用。赤眼蜂、瓢虫等天敌放飞区禁用。5.用过的容器应妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。6.使用后应用肥皂和足量清水冲洗手部、面部和其它裸露的身体部位以及药剂污染的衣物等。7.建议与其他作用机制不同的杀虫剂轮换使用，以延缓抗性产生。8.避免孕妇及哺乳期妇女接触本品。

中毒急救措施：

不慎吸入，应将病人移至空气流通处。溅入眼睛，立即用清水冲洗至少15分钟，仍有不适时，就医。皮肤接触时，用清水及肥皂洗干净。误服则应立即携此标签将病人送医院对症治疗。无特效解毒剂。

储存和运输方法：

本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源或热源。置于儿童、无关人员触及不到之处，并加锁保存。勿与粮食、食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。

生产日期及批号:见喷码

质量保证期:2年

杀虫剂

