
哈溉
使用范围和使用方法：
作物/场所 防治对象 用药量(制剂量/亩) 施用方式
葡萄 白腐病 1000—2000倍液 喷雾
使用技术要求：
1.本品应于葡萄白腐病发病前或发病初期开始施药，间隔7—10天施药1次，视病害发生情况可连续用药2—3次。2.大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。3.本品在葡萄上使用时的安全间隔期为7天，每季作物最多使用3次。
产品性能：
本品是由戊唑醇和克菌丹复配而成的一种杀菌剂，施药后能快速在作物表面形成保护膜，阻断病原菌的侵入和萌发。戊唑醇为三唑类杀菌剂，具有优异的内吸、治疗活性，能抑制高等真菌病原物细胞膜上的麦角甾醇去甲基化，使真菌病原物无法形成细胞膜，从而杀死病原菌。克菌丹为有机硫类杀菌剂，具有多作用位点特性，以保护作用为主，兼具一定的治疗活性，其能快速渗透进入病菌孢子体内，干扰病菌的呼吸作用、细胞膜的形成和细胞的分裂，从而杀死病原菌。二者混配用于防治葡萄白腐病。
备注：质量分数33.5%(克菌丹26.8%，戊唑醇6.7%)。
质量保证期：2年 生产日期及批号：见喷码
农药登记证号：PD20263466
农药生产许可证号：农药生许(川)0034
产品质量标准号：Q/91510113MA63
PG510C-96-2025
净含量：1千克
杀菌剂


克菌·戊唑醇
总有效成分含量：400克/升
有效成分及其含量：
克菌丹320克/升 戊唑醇80克/升
剂型：悬浮剂
微毒
登记证持有人及生产企业：四川百事东旺生物科技有限公司
住所和生产地址：四川省成都市蒲江县工业南路61号
邮编：611630 电话：028-60586789
杀菌剂


班隐
注意事项：
1.使用前仔细阅读此标签，并严格按照标签使用。2.建议与其他作用机制不同的杀菌剂轮换使用，以延缓抗性产生。3.本品对眼睛有刺激性，使用时避免接触。配药和施药时应穿长衣长裤防护服、鞋子、戴帽子、口罩、护目镜和防护手套等防护用具，避免眼睛或皮肤接触及口鼻吸入；工作期间不可吸烟、饮水和进食；工作后及时清洗手、脸等暴露部位皮肤，更换并清洗防护衣物和用具。4.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处理，应及时交回农药经营者或农药包装废弃物回收站；禁止在河塘等水体中清洗施药器具，施药后剩余药液不得随意倾倒；水产养殖区、河塘等水体及附近禁用。5.儿童、孕妇、哺乳期妇女及过敏者避免接触本品。
中毒急救措施：
使用中或使用后如出现不适，应立即停止接触，采取急救措施，并携带标签送医院就诊。溅入眼睛，用大量清水冲洗至少15分钟，皮肤接触，脱去被污染的衣物后立即用清水冲洗至少15分钟。误吸，立即离开施药现场并转移至空气流通处。误服，用清水充分漱口后，立即携带标签送医院就诊。本品无特殊解毒剂，对症治疗。
储存和运输方法：
1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处，不可倒置。远离火源、热源。2.本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方，并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋；装卸人员穿戴防护用具，要轻搬轻放，确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。5.本品与中等氧化剂化学不相容，应避免与氧化剂接触。
杀菌剂

